

# ANTES DE DONAR SANGRE COMÉNTENOS SU SITUACIÓN



**RELACIONES SEXUALES:** si ha mantenido relaciones sexuales con diferentes parejas, hombres o mujeres, con o sin protección.



**DROGAS:** si toma o ha tomado drogas o se ha inyectado hormonas o esteroides para el aumento de la musculación.



**CONVIVENCIA:** si convive o tiene contacto directo con personas infectadas de SIDA o hepatitis B o C.



**TATUAJES / PIERCINGS:** si se ha hecho tatuajes, "piercings", acupuntura o algún tratamiento con agujas en los últimos 4 meses.



**OPERACIONES:** Si le han realizado alguna operación, endoscopia o algún tratamiento con catéteres.



**VIAJES:** si ha realizado algún viaje fuera de España en el último año.



**ENFERMEDADES:** si ha padecido enfermedades graves o bien está pendiente de alguna prueba médica.



**MEDICACIÓN:** Si toma o ha tomado medicación o ha recibido alguna vacuna en el último mes.



**ENFERMO:** Si tiene o ha tenido malestar general, fiebre, catarro, diarreas, etc. en los últimos 15 días.



**SANO**



Momento contagio de la infección



**PERIODO VENTANA**

**ENFERMO**



Pruebas analíticas positivas



## ¿Qué es el período ventana de una infección?

Es el tiempo que transcurre entre el contagio de una enfermedad y la posibilidad de su detección en un análisis de sangre. En el caso del SIDA pueden pasar entre 1 y 3 meses, al igual que para la hepatitis B y C.

Los primeros síntomas suelen pasar inadvertidos y la persona ignora que puede contagiar esa enfermedad. Por esta razón los Bancos de Sangre deben hacer todas estas preguntas y realizar los análisis preventivos pertinentes para que la sangre sea segura.

Si tiene alguna duda, consúltenos.

Muchas gracias por su colaboración.